

Вакцинація від Covid-19

Важливо вакцинуватися у повному обсязі. Після базової імунізації (дві вакцинації), будь ласка, вакцинуються втретє. Тільки за допомогою цієї ревакцинації, також відомої як бустерна вакцинація, ви найкраще захиститеся від тяжкого перебігу захворювання. Для остаточного припинення пандемії найефективнішим способом є вакцинація від Covid-19.

Варіанти вакцинації Мобільної команди з вакцинації:

Години роботи стаціонарних пунктів вакцинації

Щодня з 12:00 до 18:00

Пункт вакцинації

MITTE

MEDI-LEARN

Bahnhofstraße 24

35037 Marburg

(Банхофштрассе 24

35037 Марбург)

Пункт вакцинації OST

Am Bärenbach

35260 Stadtallendorf

(У Беренбаху

35260

Штадталлендорф)

Для всіх осіб віком від
12 років

З понеділка по неділю З понеділка по неділю

Для дітей від 5 років

Щосуботи

Щочетверга

Impressum

Herausgeber: Kreisausschuss des Landkreises

Marburg-Biedenkopf

Fachbereich Gesundheitsamt

Schwanallee 23, D - 35037 Marburg

Fachdienst Corona

Mobiles Impfteam

Impfteam-Corona@marburg-biedenkopf.de

Marburg, März 2022

Ми керуємося рекомендаціями Постійної комісії з вакцинації. Це рекомендує вакцинувати від COVID 19 дітям від 5 років з уже існуючими хворобами, та взагалі людям від 12 років.

Подальші публічні мобільні кампанії та пояснення з вакцинації Інституту Роберта Коха вашою державною мовою можна знайти на нашій домашній сторінці:

https://www.marburg-biedenkopf.de/soziales_und_gesundheit/corona/Impfzentrum.php

або під QR-кодом:



На домашній сторінці ви також знайдете посилання на медичний кооператив Prima eG та центр вакцинації Німецького Червоного Хреста в Беденкопфі.

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нами через нашу адресу електронної пошти impfteam-corona@marburg-biedenkopf.de

Чи потрібно вакцинуватися, якщо я вже був заражений вірусом?

Так. Якщо ви перехворіли на коронавірус, ви маєте лише тимчасовий захист від повторного захворювання. Як правило, STIKO (Постійна комісія з питань вакцинації) рекомендує вакцинацію через щонайменше три місяці після виявлення коронавірусної інфекції. Вакцинацію можна робити вже через чотири тижні після припинення симптомів COVID-19. Найкраще поговорити про це

зі своїм лікарем/лікаркою.

Чи має вакцинація побічні ефекти?

Як і при будь-якій вакцинації, можуть виникнути побічні ефекти незабаром після вакцинації. Найпоширенішою реакцією є біль у місці ін'єкції. Інші реакції можуть включати лихоманку, втому та головний біль. Такі реакції зазвичай розвиваються протягом двох днів після вакцинації та тривають лише кілька днів.

Кому не слід робити щеплення?

- Усім особам, які страждають від гострого захворювання з лихоманкою (38,5°C або вище), слід вакцинуватися лише після повного одужання. З іншого боку, легка застуда або підвищена температура (нижче 38,5°C) не є причиною для відкладення вакцинації.
- Якщо у вас підвищена чутливість до будь-якого компонента вакцини. Перед вакцинацією, поговоріть з особою, яка проводить вакцинацію, про те, що у вас є алергія, наприклад.

Серйозні захворювання та смертність можна зменшити лише за умови вакцинації достатньої кількості людей. Це можливо лише за умови, якщо кожен із нас буде вакцинований у повному обсязі!

Джерело: Власна презентація та <https://impfen-schuetzen-testen.de/impfen/#start>